



Notes | Notas:

Date planted | Fecha de siembra:

Light Exposure Luz	sun	sol	
Hardiness Resistencia	USDA 5-9 (hardy to -20°F)	USDA 5-9 (resistente hasta -28°C)	
Size Tamaño	4-5' tall and wide	1.2-1.5m de alto y de ancho	
Spacing Espaciado	4-6'	1.2-1.8m	
Bloom Time Tiempo de floración	spring	primavera	
Pruning Poda	after flowering	después de florecer	
Soil Sustrato	moist, well-drained soil	suelo húmedo y bien drenado	
Care Cuidados	fertilize in spring	fertilizar en primavera	
Uses Usos	hedges, borders, cutting gardens	setos, arriates, jardines de corte	
Deer Resistance Resistencia a los venados	high alta	medium mediana	low baja

Planting | Plantar

1. Dig hole wider than pot and as deep. | Cava un hoyo más ancho que la maceta e igual que profundo.
2. Carefully remove rootball from pot, place in hole, and backfill. | Retira con cuidado el cepellón de raíces de la maceta, trasládalo al hoyo, y vuelve a llenar el hoyo.
3. Water well and apply 2-3" of mulch. | Riega bien y aplica 5-8cm de mantillo.



For questions and complete care instructions, visit ProvenWinners.com/ShrubCare

Para ver preguntas e instrucciones de cuidado completas, visita ProvenWinners.com/ShrubCare



Chaenomeles speciosa 'Scarlet Storm'
PP#20951

The large, double flowers of DOUBLE TAKE SCARLET™ quince appear in early spring and occasionally during summer. This thornless shrub is ideal for flower arranging.

Las flores dobles grandes del membrillero de flor DOUBLE TAKE SCARLET™ brotan a principios de primavera y a veces en verano. No tiene espinas, y las flores son ideales para el diseño floral.